



PRESSMEDDELANDE
27 juni 2025 13:00:00 CEST

Stockholm3 inkluderat i NCCN:s riktlinjer för tidig upptäckt av prostatacancer

Från och med juni 2025 har Stockholm3 inkluderats som ett diagnostiskt verktyg för beslutsfattande om biopsi i NCCN:s uppdaterade amerikanska kliniska riktlinjer för tidig upptäckt av prostatacancer (NCCN Clinical Practice Guidelines for Prostate Cancer Early Detection).

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN)® är en ledande amerikansk institution som etablerar standarder för klinisk praxis inom cancervård. Stockholm3 har lagts till i NCCN:s kliniska riktlinjer inom onkologi för tidig upptäckt av prostatacancer, version 2.2025 [1]. NCCN:s riktlinjer anger att sannolikheten för höggradig cancer (Grade Group ≥ 2) kan preciseras ytterligare före initial biopsi med hjälp av verktyg som Stockholm3. Stockholm3 kategoriseras som en rekommendation på 2A-nivå, vilket indikerar konsensus hos NCCN:s expertpanel om att Stockholm3 är ett lämpligt alternativ baserat på nuvarande evidens.

"Inkluderingen av Stockholm3 i NCCN:s riktlinjer bekräftar dess kliniska relevans och verifierar att vårt test är ett kraftfullt verktyg för tidig upptäckt av aggressiv prostatacancer", säger Martin Steinberg, arbetande styrelseordförande i A3P Biomedical.

"Detta är en viktig milstolpe i vår strävan att vidareutveckla precisionsdiagnostik inom prostatacancer," avslutar Martin Steinberg.

NCCN:s erkännande bidrar till ett ökande internationellt momentum för Stockholm3 och stärker dess position för bredare användning i klinisk praxis. I takt med att förekomsten av prostatacancer fortsätter att stiga globalt ökar behovet och efterfrågan på screeningverktyg som möjliggör mer exakta, tidigare och mindre invasiva diagnoser.

[1] Moses, KA, Sprenkle PC, Bahler C, Box G, Carlsson SV, Catalona WJ, Dahl DM, Dall'Era M, Davis JW, Drake BF, Eggener S, Etzioni RB, Farrington TA, Garraway IP, Jarrard D, Kauffman E, Kaye D, Kibel AS, LaGrange CA, Lotan T, Maroni P, Reys B, Salami SS, Sanchez A, Seibert TM, Shaneyfelt TM, Shoag J, Smaldone MC, Sonn G, Tyson II MD, Vapiwala N, Wake R, Washington III S, Yu A, Yuh B, Freedman-Cass D, Howley R, Kovach E. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Prostate Cancer Early Detection v2.2025. Tillgänglig 06/24/25. För att se den senaste och fullständiga versionen av NCCNs riktlinjer, besök NCCNs hemsida [NCCN.org](https://www.nccn.org)



För ytterligare information kontakta:

Cecilia Edström, tf CFO
Telefon: +46 72 226 23 28
E-post: cecilia.edstrom@a3p.com

Om A3P Biomedical

A3P Biomedical är ett bolag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer. A3P:s huvudprodukt, Stockholm3, är ett kliniskt och kommersiellt validerat blodtest för tidig upptäckt och riskstratifiering av aggressiv prostatacancer. A3P Biomedical har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, besök www.a3p.com

Om Stockholm3

Stockholm3 är ett blodbaserat prostatacancer test som analyserar en kombination av proteinmarkörer, genetiska biomarkörer och klinisk information i en algoritm för att hitta sannolikheten för kliniskt signifikant cancer vid biopsi.

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier med fler än 90 000 män. Det är testat i såväl stora populationsbaserade screeningstudier som i kliniska studier i primärvården. Att använda Stockholm3 leder till en mer träffsäker riskbedömning än den nuvarande PSA-standarden. Stockholm3 upptäcker 41 - 89 % fler män med aggressiv prostatacancer och minskar samtidigt överdiagnostiken med 37 - 52 % jämfört med PSA.

Ett flertal Stockholm3-studier har publicerats i inflytelserika tidskrifter som The Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology och European Urology. Studierna behandlar både specificiteten och sensitiviteten hos Stockholm3 i multi-etniska populationer samt hälsoekonomiska fördelar med att implementera testet i kliniskt bruk. För mer information om Stockholm 3 och våra kliniska studier, besök: www.stockholm3.com/

Om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. År 2020 var den globala incidensen av nya prostatacancerfall 1,4 miljoner och den prostatacancerspecifika dödligheten 370 000. Den globala förekomsten och dödligheten i prostatacancer förväntas öka med 100 % respektive 85 % till 2040, till följd av en åldrande befolkning.



Bifogade filer

[Stockholm3 inkluderat i NCCN:s riktlinjer för tidig upptäckt av prostatacancer](#)